MR# ..... Patient Name: .....

الحول

الحول هو انحراف العين عن الاتجاه الصحيح والهدف من العملية الجراحية تعديل وضع العين واتساقها سوياً.

تعليمات الخروج:

1. بعد العملية مباشرة من الطبيعي الشعور بدوخة وعدم تركيز سوف تتحسن الأعراض بشكل تدريجي
2. من الطبيعي حدوث قيء لمدة 24 ساعة بعد العملية نتيجة لمفعول المخدر ولكن في حال إستمراره لأكثر من 24 ساعة فإنه عليك إخبار الطبيب أو الذهاب إلى قسم الطوارىء
3. تجنب الرياضات العنيفة أو الأنشطة الشديدة لمدة إسبوعين بعد العملية
4. تجنب غمر الرأس بشكل كامل في الماء لمدة أسبوعين بعد العملية
5. تجنب السباحة لمدة ثلاث أسابيع
6. بالإمكان الإستحمام وإستخدام شامبو الأطفال مع تجنب دخول الماء والصابون بشكل مباشر داخل العين
7. في حال تم وصف علاجات أو قطرات للعين عليك بإستخدامها (حسب إرشادات الطبيب المختص)
8. في حال وضع القطرة للأطفال بالإمكان وضعها خلال النوم
9. الغرز المستخدمة في الجراحة سوف تذوب بشكل تلقائي
10. من الطبيعي ملاحظة خروج بعض الدم مع الدموع ووجود إحمرار في زوايا العين (قد تستمر لفتره 4 أسابيع بعد الجراحة)
11. من الطبيعي حدوث إزدواج في الرؤية قد يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاث أسابيع بعد الجراحة
12. في حال إستخدام النظارات الطبية قبل الخضوع للعملية فإنه عليك بمناقشة الطبيب لمعرفة فيما لو كان هناك ضرورة لإرتدائها بعد العملية
13. من الطبيعي الشعور بتحسس بسيط وحرقان
14. سيتم تغطية العين اللتي خضعت للجراحة
15. تجنب فرك أو حك العين
16. سوف يتم إعطائك الأدوية قبل الخروج مع شرح طريقة إستخدامها

يجب عليك زياره عياده العيون أو التوجه لوحده الطوارىء في حال:

- إزدياد شدة الألم
- إزدياد التورم وخروج إفرازات أو قيح من العين
- خروج كتل حمراء من العين
- إرتفاع درجة الحرارة ل38,5 درجة مئوية ومافوق

مراجعة الطبيب :

- قبل الخروج سيتم عمل موعد للمراجعه في عياده العيون خلال إسبوع

الطبيب المعالج: ..... التوقيع والرقم الوظيفي: ..... اليوم: .....